Allegato 2
(art. 45 cpv. 2)

Indicazioni e medicamenti di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera a
(Versione giugno 2023)

Osservazioni generali:

- dispensazione senza prescrizione/preliminare consultazione medica nel rispetto delle indicazioni dell'informazione professionale sul medicamento (IP), in particolare del limite d'età;
- la colonna «Altre osservazioni» contiene ulteriori restrizioni rispetto all'informazione professionale;
- per i preparati combinati valgono le restrizioni dei singoli principi attivi;
- la grandezza dell'imballaggio è limitata alla quantità necessaria per la durata della terapia secondo la tabella o le indicazioni contenute nell'informazione professionale sul medicamento;
- è esclusa la dispensazione alle donne durante la gravidanza o l'allattamento;
- i preparati contrassegnati con un asterisco (*) figurano nell'elenco conformemente all'articolo 45 capoverso 3 OM (medicamenti ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. c OM).

1. Rinite allergica stagionale

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Bilastina	Compresse Compresse orodispersibili Soluzione	Orale	20 mg 10 mg 2,5 mg/ml	Max. 1 mese	Bambini a partire dai 6 anni
Cetirizina dicloridrato	Compresse Gocce		10 mg 10 mg/ml		
Desloratadina	Compresse Soluzione		5 mg 0,5 mg/ml		
Levocetirizina dicloridrato	Compresse Gocce		5 mg 5 mg/ml		
Ketotifene	Compresse		1 mg		
Fexofenadina cloridrato	Compresse		120 mg		
Loratadina	Compresse		10 mg		
Azelastina cloridrato	Spray nasale	Nasale	0,14 mg/ spruzzo		
Fluticasone furoato	Spray nasale		27,5 µg/ spruzzo		Solo per adulti
*Mometasone furoato	Spray nasale		50 µg/ spruzzo		
*Triamcinolone acetonide	Spray nasale		55 µg/ spruzzo		

2. Malattie oftalmiche

a. Congiuntivite allergica stagionale

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Azelastina cloridrato	Collirio	Locale	0,5 mg/ml	Max. 1 mese	Bambini a partire dai 6 anni
Ketotifene	Collirio		0,25 mg/ml		
Olopatadina	Collirio		1 mg/ml		
Epinastina cloridrato	Collirio		0.5 mg/ml		A partire dai 12 anni

b. Congiuntivite batterica

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Esamidina diisetionato	Collirio	Locale	1 mg/ml		

c. Secchezza oculare

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Acido ialuronico	Gel oculare	Locale	0,092 mg/0,65 ml		

3. Malattie acute delle vie respiratorie

a. Rinite

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Pseudoefedrina cloridrato	Capsule retard	Orale	120 mg		

b. Broncospasmo

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Salbutamolo	Nebulizzatore	Inalativo	100 µg/ spruzzo	Max. 2 settimane	Bambini a partire dai 6 anni La dispensazione deve rispettare le attuali linee guida sul trattamento dell'asma e della BPCO
Terbutalina solfato	Polvere per inalazione		500 µg/ spruzzo		

c. Altro

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Cineolo Ossichinolina solfato di potassio Terpina idrato	Supposte	Rettale	80 mg 5 mg 15 mg		

d. Tosse

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Codeina fosfato emiidrato Guaifenesina	Gocce	Orale	10 mg/ml 100 mg/ml		
*Codeina fosfato emiidrato	Gocce		13,6 mg/g		
*Codeina idrogeno fosfato Guaifenesina Efedrina HCl Estratto liquido di poligala	Sciroppo		20 mg/15 ml 300 mg/15 ml 15 mg/15 ml 31,5 mg/15 ml		
*Destrometorfano	Sciroppo		7.3 mg/5 ml 12,5 mg/5 ml 11.5 mg/5 ml 18,5 mg/10 ml		
	Pastiglie		7.7 mg		
	Compresse		25 mg		
	Capsule Retard		36.6 mg		
	Gocce		20,8 mg/ml		
*Diidrocodeina cloridrato Difenidramina cloridrato	Sciroppo		10 mg/5 ml 15 mg/5 ml		
*Diidrocodeina tiocianato	Gocce		10 mg/ml		
*Diidrocodeina tiocianato Tintura di belladonna Estratto di drosera Guaifenesina	Gocce		10 mg/ml 10 mg/ml 10 mg/ml 92,5 mg/ml		
*Oxomemazina	Sciroppo		1,65 mg/5 ml		

4. Malattie gastrointestinali

a. Nausea, vomito

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Domperidone	Compresse Compresse orodispersibili	Orale	10 mg		
Domperidone	Sospensione		1 mg/ml		

b. Sintomi da reflusso

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Dexlansoprazolo	Capsule retard	Orale	30 mg	Max. 2 settimane	Solo per adulti
Esomeprazolo	Granulato per sospensione orale		10 mg		
	Capsule Compresse		20 mg		
Lansoprazolo	Capsule		15 mg		
Omeprazolo	Capsule Compresse		10 mg 20 mg		
Pantoprazolo	Compresse		20 mg		
Rabeprazolo sodico	Compresse		10 mg		

c. Disturbi intestinali funzionali

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministraz ione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Mebeverina cloridrato	Capsule retard	Orale	200 mg	Max. 2 settimane	Solo per adulti

d. Stitichezza

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Macrogol 3350 Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Cloruro di potassio	Polvere Soluzione da bere	Orale	13,125 g 178,6 mg 350,8 mg 50,2 mg	Secondo il giudizio del farmacista	Solo per adulti
Macrogol 3350 Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Cloruro di potassio	Polvere		13,125 g 178,5 mg 350,7 mg 46,6 mg		
Macrogol 3350 Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Cloruro di potassio	Polvere		6,563 g 89,3 mg 175,4 mg 23,3 mg		Bambini a partire dai 6 anni
Macrogol 3350 Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Cloruro di potassio	Polvere		6,563 g 89,3 mg 175,4 mg 25,1 mg		
Sodio picosolfato	Gocce		7,5 mg/ml		

e. Trattamento acuto delle emorroidi

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Calcio dobesilato Lidocaina cloridrato Desametasone acetato	Pomata	Locale	40 mg/g 20 mg/g 0,25 mg/g	Max. 3 giorni	Solo per adulti
Policresulene Cincocaina cloridrato	Pomata		50 mg/g 10 mg/g	Max. 1 settimana	
Policresulene Cincocaina cloridrato	Supposte	Rettale	100 mg 2,5 mg	Max. 1 settimana	

f. Sovrappeso

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministrazione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Orlistat	Capsule	Orale	120 mg	12 settimane	Solo per adulti

5. Dermatosi

a. Infezioni cutanee batteriche

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Sulfadiazina argentica Ialuronato sodico	Crema	Locale	10 mg/g 2mg/g		

b. Infezioni cutanee virali

1. Erpete

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Acyclovir	Crema	Locale	50 mg/g		

2. Verruche

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Acido monocloracetico	Soluzione	Locale	500 mg/g		
Tretinoina Urea Dexpantenolo	Crema		0.3 mg/g 120 mg/g 10 mg/g		

c. Parassitosi - scabbia

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Permetrina	Crema	Locale	50 mg/g		

d. Acne volgare

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Adapalene	Gel Crema	Locale	1 mg/g	Secondo il giudizio del farmacista	Devono essere documentate la conferma dell'assenza di una gravidanza e l'informazione sul rischio in caso di gravidanza
Isotretinoina	Gel		0,5 mg/g		

e. Rosacea

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Ivermectina	Crema	Locale	10 mg/g		

f. Dermatomicosi

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Ciclopiroxolamina	Shampoo Soluzione Crema	Locale	15 mg/g 10 mg/ml 10 mg/g	Secondo il giudizio del farmacista	Adolescenti a partire dai 12 anni
Miconazolo nitrato	Shampoo		20 mg/g		
Ketoconazolo	Crema Shampoo		20 mg/g		
Nistatina Ossido di zinco	Pasta		100 000 U.I./g 200 mg/g		

g. Micosi e infezioni cutanee batteriche, dermatomicosi infiammatorie

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Clotrimazolo Esamidina diisetionato	Crema	Locale	10 mg/g 2,5 mg/g		
Clotrimazolo Esamidina diisetionato Prednisolone acetato	Crema		10 mg/g 2,5 mg/g 5 mg/g	Max. 2 settimane	

g. Onicomicosi

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Amorolfina	Smalto per unghie	Locale	50 mg/ml	Secondo il giudizio del farmacista	
Ciclopirox	Smalto per unghie		80 mg/g		

h. Dermatiti ed eczemi non infetti

Osservazioni

- Sono escluse le applicazioni perioculari, ascellari e perigenitali in ragione degli effetti secondari (atrofia cutanea).
- Può essere dispensato solo l'imballaggio più piccolo.

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Clobetasone-17-butirrato	Crema	Locale	0,5 mg/g	Max. 3 settimane 1 volta al giorno	
Idrocortisone-17-butirrato	Crema		1 mg/g		
	Emulsione		1 mg/g		
Acido salicilico Triamcinolone acetonide	Tintura		20 mg/g 2 mg/g		Esclusa l'applicazione sulle orecchie

i. Orticaria

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Bilastina	Compresse	Orale	20 mg	Max. 1 mese	Bambini a partire dai 6 anni
	Compresse orodispersibili		10 mg		
	Soluzione		2,5 mg/ml		
Cetirizina dicloridrato	Compresse		10 mg		
	Gocce		10 mg/ml		
Desloratadina	Compresse		5 mg		
	Soluzione		0,5 mg/ml		
Ketotifene	Compresse		1 mg		
Levocetirizina dicloridrato	Compresse		5 mg		
	Gocce		5 mg/ml		
Fexofenadina dicloridrato	Compresse		180 mg		A partire dai 12 anni
Loratadina	Compresse		10 mg		

j. Alopecia androgenetica

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Finasteride	Compresse	Orale	1 mg	Secondo il giudizio del farmacista	Informazione attiva sugli effetti indesiderati a ogni dispensazione

k. Anestesia locale

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Lidocaina Prilocaina	Crema	Locale	25 mg/g 25 mg/g		Può essere dispensato solo l'imballaggio più piccolo
	Patch		25 mg/ patch 25 mg/ patch		

6. Malattie urogenitali

a. Micosi vaginali

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Ciclopiroxolamina	Ovuli	Vaginale	100 mg	La dispensazione non può essere ripetuta nei tre mesi successivi.	Dispensazione solo per quadro clinico noto della paziente. Non a bambine prima del menarca.
	Crema vaginale		10 mg/g		
Econazolo nitrato	Ovuli		50 mg		
	Ovuli		150 mg		
	Crema vaginale		10 mg/g		
Iodopovidone	Ovuli		200 mg		

b. Ricostituzione della flora vaginale fisiologica

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Estriolo Lactobacillus acidophilus	Compresse vaginali	Vaginale	0,03 mg 10 mio.		Informazione attiva sulle controindicazioni a ogni dispensazione Dispensazione di max. 6 compresse.

c. Trattamento e profilassi delle infezioni da catetere vescicale

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Clorexidina acetato	Soluzione	Locale	0,020 g/100ml		

d. Disfunzione erettile

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Sildenafil	Compresse Compresse orodispersibili	Orale	25 mg		Informazione attiva sulle controindicazioni a ogni dispensazione. Dispensazione di max. 4 compresse.

7. Dolori acuti

Osservazioni

- Sono esclusi dolori cronici, neuropatici e qualsiasi altro dolore che richieda una diagnosi medica prima dell'assunzione di un medicamento
- La dose giornaliera massima sotto indicata vale per gli adulti.

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Acido acetilsalicilico	Polvere	Orale	1000 mg	Max. 1 settimana	Dose giornaliera massima 3000 mg
Diclofenac	Confetti gastroresistenti Compresse gastroresistenti Capsule		25 mg	Max. 1 settimana	Dose giornaliera massima 150 mg
	Confetti Granulato Capsule Confetti gastroresistenti Compresse gastroresistenti Compresse		50 mg		
	Gocce		15 mg/ml		
	Supposte	Rettale	12,5 mg 25 mg 50 mg		
Ibuprofene	Compresse	Orale	200 mg	Max. 1 settimana	Dose singola massima 600 mg Dose giornaliera massima 1800 mg
	Granulato Compresse		400 mg		
	Granulato Compresse		600 mg		
	Sospensione		100 mg/5ml 200 mg/5ml		
Ketoprofene	Gel	Locale	25 mg/g	Max. 1 settimana	
Acido mefenaminico	Capsule	Orale	250 mg	Max. 1 settimana	Dose giornaliera massima 1500 mg
	Compresse		500 mg		
	Supposte	Rettale	125 mg 500 mg		
Metamizolo	Compresse	Orale	500 mg	Max. 1 settimana	Bambini esclusi Dose giornaliera massima 3000 mg
	Gocce		500 mg/ml		
	Supposte	Rettale	1000 mg		
Naprossene	Compresse	Orale	250 mg 500 mg	Max. 1 settimana	Dose giornaliera massima 1000 mg
Naprossene sodico	Compresse		550 mg		Dose giornaliera massima 1100 mg
Paracetamolo	Compresse effervescenti Compresse	Orale	1000 mg	Max. 1 settimana	Dose giornaliera massima 3 g
	Supposte	Rettale	1000 mg		

8. Emicrania

Osservazioni:

- dispensazione in presenza di emicrania diagnosticata da un medico;
- previo consenso del paziente, al medico curante viene comunicata ciascuna dispensazione.

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Almotriptan	Compresse	Orale	12,5 mg	Dimensioni dell'imballaggio per il trattamento di un attacco acuto di emicrania	Solo per adulti
Eletriptan	Compresse		40 mg		
Frovatriptan	Compresse		2,5 mg		
Naratriptan	Compresse		2,5 mg		
Rizatriptan	Compresse Compresse orodispersibili		5 mg		
Sumatriptan	Compresse	Orale	50 mg		
	Spray nasale	Nasale	10 mg		
Zolmitriptan	Compresse Compresse orodispersibili	Orale	2,5 mg		
	Spray nasale	Nasale	2,5 mg		

9. Carenza di vitamine e sali minerali

a. Carenza di potassio

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Cloruro di potassio	Compresse retard	Orale	745,5 mg (10 mmol di potassio)		
	Compresse retard		600 mg (8 mmol di potassio)		
*Citrato di potassio *Idrogenocarbonato di potassio	Compresse effervescenti		1686 mg 1444 mg (30 mmol di potassio)		

b. Carenza di magnesio

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Aspartato di magnesio	Compresse rivestite	Orale	615 mg (2,5 mmol Mg^{2+})		
	Granulato		1,23 g / bustina (5 mmol Mg^{2+}) 2,46 g / bustina (10 mmol Mg^{2+})		
	Compresse effervescenti		1,844 g (7,5 mmol Mg^{2+})		
Citrato di magnesio	Granulato		1,863 g / bustina (12,4 mmol Mg^{2+})		

10. Profilassi della carie

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Fluoruro di sodio	Pasta	Locale	11mg/g (5 mg/g fluoruro)		

11. Disturbi dell'addormentamento

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Dossilamina succinato	Gocce	Orale	10 mg/ml		
* Difenidramina cloridrato	Compresse		50 mg		
	Gocce		60 mg/ml		

12. Disturbi ipotensivi della circolazione sanguigna

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Etilefrina cloridrato	Soluzione	Orale	7,5 mg/g		

13. Chinetosi e disturbi dell'equilibrio

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
*Cinnarizina	Compresse Gocce	Orale	25 mg 75 mg/g		

14. Contraccezione d'emergenza

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Levonorgestrel	Compresse	Orale	1,5 mg		
Ulipristal acetato	Compresse rivestite		30 mg		

15. Disassuefazione dal fumo

Osservazioni

- Dispensazione solo nell'ambito di un programma strutturato di disassuefazione.
- Escluso in caso di malattie psichiche o epilessia.

Principio attivo	Forma farmaceutica	Modo di somministra-zione	Quantità di principio attivo per unità	Durata della terapia	Altre osservazioni
Vareniclina	Compresse	Orale	0,5 mg 1 mg		